


## Dyspepsi Udredning og behandling af voksne med symptomer fra øvre mave-tarm-kanal

### Udredning og behandling af dyspepsi, relateret til ASA/NSAID-forbrug



### NSAID og gastrointestinale bivirkninger

#### Hvorledes forebygges ASA/NSAID-relaterede ulcuskomplikationer?

- Den enkelte patients risiko for ulcus/ulcuskomplikationer afhænger af en række faktorer, der skal indgå i vurderingen af indikation for profylakse. Risikoen stiger med det samlede antal risikofaktorer.
- Risikofaktorer for ulcuskomplikation ved ASA/NSAID-behandling:
  - Alder (risiko er stigende med alder, specielt >60 år)
  - Tidligere ulcus
  - Tidligere ulcusblødning/perforation
  - Dyspepsi
  - Anden sygdom (diabetes, hjerte-kar-sygdom eller svær kronisk leddegigt)
  - Samtidig behandling med steroid, selektive serotonin-reuptake-hæmmere (SSRI) eller antikoagulationsbehandling.
- Misoprostol og syrepumpehæmmer (PPI) skønnes at være ligeværdige til at forebygge ASA/NSAID-relateret ulcus, men PPI medfører færrest bivirkninger og anbefales derfor.